


Avertissements agricoles



BULLETIN PÉRIODIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES DE
BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTÉ

SERVICE RÉGIONAL DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Z.I. NORD - B.P. 194 - 21206 BEAUNE CÉDEX

ABONNEMENT ANNUEL 140 F. Régisseur Recettes D.R.A.F. CCP DIJON 35 000 28 D



80.22.19.38

EDITION GRANDES CULTURES

Bulletin n° 16 - 4 juin 1987

COLZA

Alternaria : *Pas de traitement dans l'immédiat*

POIS

Maladies : *Pas de symptômes*

Pas de traitement dans l'immédiat

Tordeuse : *Localement, traitement à prévoir vers le 10-15/06*

BLE : *Protection épiaison en situations tardives*

COLZA

SITUATION :

- Depuis la semaine dernière la situation a peu changé : les symptômes d'alternaria sont toujours rares et localisés aux feuilles basses.
- Cependant les conditions météorologiques actuelles peuvent être favorables à cette maladie, et une surveillance s'impose.

PRECONISATION :

Ne pas envisager de traitement dans l'immédiat.

POIS

La floraison est atteinte dans pratiquement tous les secteurs, excepté les situations tardives de plateaux qui sont au stade bourgeonnement floral.

MALADIES

SITUATION : Toujours très saine. Absence de symptômes d'Anthracnose et de Botrytis.

PRECONISATION : Les traitements fongicides sont déconseillés.

Surveiller l'apparition de foyers de Botrytis à partir de la chute des pétales.

TORDEUSE DU POIS

SITUATION :

- Comme indiqué dans le bulletin précédent le vol est commencé depuis le 15-20/05 environ.
- Les niveaux de captures notés actuellement :

YONNE : Sens 17, Champlost 44, Lixy 24, Senan 32, Commissey 10

COTE-D'OR : Longchamps 0, Champdôtre 5, Binges 0, Bretigny 6, Epoisses 44,
Nuits-St-Georges 0, Aignay-le-Duc 1.

NIEVRE : St-Martin/Nohain (Donzy) 143, Varzy 1.

P.31

PRECONISATION :

- Nièvre dans le secteur de Donzy une intervention insecticide est à prévoir dans la période du 10 au 15 juin. Les spécialités utilisables : Azophène 1,2 l/ha, Sumicidin 10 0,5 L/ha, Thiodan CE 2,0 l/ha, Zolone Flo 1,4 l/ha.
- Dans les autres régions, les niveaux de captures ne justifient pas de traitements insecticides dans l'immédiat. Attendre le prochain bulletin.

B L E

STADES : Plaine et secteurs précoces 10.1 à 10.5, floraison amorcée pour les parcelles en avance
Plateaux et secteurs tardifs 10 à 10.2.

MALADIES

SITUATION :

Septoriose : peu d'évolution dans l'ensemble, progression localement notée jusque sur F2 voire F1 en situation non protégée.

Oïdium : le plus souvent en stagnation avec cependant quelques progressions touchant la F2 et parfois la F1 en situations favorables.

Rouille brune : pustules observées dans le Sénonais sur Fidel, Camp Rény, Scipion, Beauchamp ; quelques pustules également observées dans d'autres secteurs (Côte-d'Or, Jura, Saône-et-Loire, Nièvre) généralement sur Fidel ou Camp Rémy.

Rouille jaune : apparition d'un foyer sur blé Thésée dans le secteur de Pesmes (Haute-Saône)

RAVAGEURS

Pucerons : parfois présents, toujours à un faible niveau de population.

Cécidomyies : présence notée en début de semaine (Est de Dijon, secteur de Beaune).

PRECONISATION :

Protection d'épiaison à envisager en secteurs tardifs. Comme indiqué dans nos précédents bulletins, le choix du produit tiendra compte à la fois du potentiel de la parcelle et de la pression parasitaire.

Aucun traitement anti-pucerons n'est actuellement justifié.

La surveillance des cécidomyies est à poursuivre jusqu'à la fin floraison (le soir en particulier par temps lourd et en absence de vent).

ORGE DE PRINTEMPS

STADES : échelonnés suivant les secteurs, les parcelles les plus précoces atteignent le stade 9.

L'Oïdium demeure la maladie la plus fréquente, la Rhynchosporiose est plus rarement observée.

PRECONISATION : Maintenir la surveillance.

Si une intervention est nécessaire, elle est à réaliser au plus tard à l'apparition des barbes.

CULTURES LEGUMIERES

MALADIES DE L'OIGNON

Poursuivre la protection contre le Mildiou, Sclerotinia et Botrytis en tenant compte du lessivage par les pluies.

*

*

*